

intime

Reklamcılık Hizmetleri A.Ş.

10 yıllık ilaç sektörü deneyimine sahip ekibimiz ile Intime ; hizmet ajansınız olarak çeşitli ilaç firmalarına dizayn konusunda yardımcı olmakta, üretimin safhasını sorunsuz tamamlanmasını sağlamaktadır.

Firmamız bünyesinde çalışan grafikerlerimiz alanında uzman, yeterli deneyime sahip donanımdadır.

İlaç üretimleri için gerekli olan kutu dizaynları; bildirilen taslaklar doğrultusunda, çeşitli ölçülerde ve dillerde matbu hale getirilebilir.

Dilerseniz firmamız tasarım konusunda da her türlü desteği sağlayacaktır.

Güven ve dikkatin önde geldiği Intime, pazara güçlü girmeniz için hep yanınızda!

KREM ÖRNEK ÇALIŞMASI

Gelen Taslak

	Ürün Adı %0.25 merhem <u>Tiyokolşikosid</u> 30 g Firma Logo KARE KOD
	Ürün Adı %0.25 Merhem BARKOD Formül..... Rühsat Sahibi : Üretici: Rühsat Tarihi-No
Ürün Adı %0.25 merhem Parti No. Son. Kul. Ta.	Ürün Adı %0.25 merhem <u>Tiyokolşikosid</u> 30 g Firma Logo
	Ürün Adı %0.25 merhem Hariçen uygulanır. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız. Kesilmiş veya açılmış ambalajları satın almayınız. Kullanmadan önce kullanma talimatını okuyunuz. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza başvurunuz. Reçeteli satılır.

Grafik Çalışması - Örnek Tasarım

Braille (körler Alfabesi)

“Ürün Adı” %0.25 Merhem

Ürün Adı® %0.25 Merhem
Tiyokolşikosit

30g

Firma Logo

Ruhsat Sahibi:
Üretim Yeri:
Ruhsat No:
Formül:

Haricen uygulanır.
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde
ve orijinal ambalajında saklayınız.
25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Kedilmiş veya açılmış ambalajları satın almayınız.
Kullanmadan önce kullanma talimatını okuyunuz.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza
başvurunuz.
Reçeteli satılır.

BARKOD

FARMAKOD

Ürün Adı® %0.25 Merhem
Tiyokolşikosit

30g

Firma Logo


Renk

K SIYAH P 321 C
P 1495 C
P 185 C


Piyas
Lüksiz Alan
Bıçak

FARMAKOD

Gelen Taslak



Grafik Çalışması - Örnek Tasarım



Gelen Taslak

Grafik Çalışması - Örnek Tasarım

KULLANMA TALİMATI	
“ÜRÜN ADI” %0.25 merhem Deri yüzeyine uygulanır. Etkin madde: 30 g'lık tüpte; Tiyokolsikosid 0.075 g Yardımcı maddeler Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. - Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz. - Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. - Bu ilaç başlatılarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz. - Bu ilacı kullanırken, sıradan, doktoru veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz. - Bu talimatı yanlarında aynen taşıyınız. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız. Bu kullanma talimatında: “ÜRÜN ADI” nedir ve ne için kullanılır? “ÜRÜN ADI” nasıl kullanılır? “ÜRÜN ADI” nasıl kullanılır? - Olası yan etkiler nelerdir? “ÜRÜN ADI” saklanması Başlıkları yer almaktadır. “ÜRÜN ADI” nedir ve ne için kullanılır? “ÜRÜN ADI”, 30 g'lık alüminyum tüp içinde 75 mg etkin maddedir bulundur. “ÜRÜN ADI” esas olarak kas gevşetici etkilere sahiptir. Tiyokolsikosid, ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisi amacıyla kullanılır. “ÜRÜN ADI” kullanılması öncesi dikkat edilmesi gerekenler “ÜRÜN ADI” aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer, - Kas veya kasların görev yapmaması (kasılmaması) durumu varsa, - Etkin maddeye ya da yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığınız varsa, - Gebelik ve emzirme döneminde iseniz. 1/4	Ayrıca, “ÜRÜN ADI” 15 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmemektedir. “ÜRÜN ADI” aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ Uzun süreli kullanmanız durumunda (aşırı duyarlılık meydana gelebilir). Bu uyarı geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. “ÜRÜN ADI” yiyecek ve içecek ile kullanılması “ÜRÜN ADI” yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamile iseniz bu ilacı kullanmayınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Eğer emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız. Araç ve makine kullanımı Nadir olarak uyuklama vakaları bildirilmiştir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz. “ÜRÜN ADI” içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Bu tıbbi ürün metil parahidroksibenzoat ve propil parahidroksibenzoat ilave eder. Bu maddeler, ürtiker ve bronkospazm ile eşlik eden kontakt dermatiti gibi alerjik reaksiyonlara (muhtemelen geciktirici) sebebiyet verebilir. Setostearil alkol içerir. Bu nedenle lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontakt dermatite) sebebiyet verebilir. Propilen glikol içerir. Bu nedenle ciltte irritasyona neden olabilir. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı Herhangi bir etkileşim bildirilmemiştir. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bu konuda bilgi veriniz. “ÜRÜN ADI” nasıl kullanılır? Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmedikçe günde 2-3 defa uygulanır. Uygulama yolu ve metodu: Deri yüzeyine ağrılı bölgeye sürülerek uygulanır. Değişik yaş grupları Bunlar “ÜRÜN ADI” hafif yan etkileridir. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuza ve eczacınıza bilgilendiriniz. “ÜRÜN ADI” saklanması “ÜRÜN ADI” 15 yaşın altındaki çocukların görmeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra “ÜRÜN ADI” kullanmayınız. Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz “ÜRÜN ADI” kullanmayınız. Ruhsat Sahibi: Üretim Yeri: Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır. Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır. 2/4

KULLANMA TALİMATI		
Renk K SİYAH KATLAMASIZ Yüksek Düşük	ÜRÜN ADI® %0.25 merhem Deri yüzeyine uygulanır. Etkin madde: 30 g'lık tüpte; Tiyokolsikosid 0.075 g Yardımcı maddeler: Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. - Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz. - Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. - Bu ilaç başlatılarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz. - Bu talimatı yanlarında aynen taşıyınız. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız. Bu kullanma talimatında: - ÜRÜN ADI nedir ve ne için kullanılır? - ÜRÜN ADI'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - ÜRÜN ADI nasıl kullanılır? - Olası yan etkiler nelerdir? - ÜRÜN ADI'nın saklanması Başlıkları yer almaktadır. - ÜRÜN ADI nedir ve ne için kullanılır? ÜRÜN ADI, tiyokolsikosid etkin maddesini içerir. 30 g'lık alüminyum tüp içinde 75 mg etkin madde bulunur. - ÜRÜN ADI esas olarak kas gevşetici etkilere sahiptir. Tiyokolsikosid, ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisi amacıyla kullanılır. - ÜRÜN ADI'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ÜRÜN ADI'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer, - Kas veya kasların görev yapmaması (kasılmaması) durumu varsa, - Etkin maddeye ya da yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığınız varsa, - Gebelik ve emzirme döneminde iseniz. Ayrıca, Ürün ADI'nın 15 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmemektedir. ÜRÜN ADI'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ Uzun süreli kullanmanız durumunda (aşırı duyarlılık meydana gelebilir). 1	Bu ilacı 15 yaşın altındaki çocuklarda kullanmayınız. Yaşlılarda kullanımı: ÜRÜN ADI'nın yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği ile ilgili veri yoktur. Özel kullanım durumları: Böbrek/Karaciğer yetmezliği: ÜRÜN ADI'nın böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği ile ilgili veri yoktur. Eğer Ürün ADI'nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınıza iletişiniz. Kullanmanız gerekenden daha fazla ÜRÜN ADI kullandıysanız: ÜRÜN ADI'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. ÜRÜN ADI'ı kullanmayı unutursanız: Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. ÜRÜN ADI ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler: Bulunmamaktadır. 4. Olası yan etkiler nelerdir? Tüm ilaçlar gibi, ÜRÜN ADI içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Aşağıdakilerden biri olursa, ÜRÜN ADI'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: - Kasıntı, döküntü, alerji sonucu yüz ve boğazda şişme gibi ani aşırı duyarlılık tepkisi Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ÜRÜN ADI'ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz: - Bulantı - Kusma - İshal - Mide ağrısı Bunlar ÜRÜN ADI'nın hafif yan etkileridir. 3

TABLET ÖRNEK ÇALIŞMASI

Gelen Taslak

Firma Logo	ÜRÜN ADI 245 mg Film Tablet <u>Tenofovir disoproksil</u>	
30 Film Tablet		
Firma Logo	Ürün Adı 245 mg Film Tablet <u>Tenofovir disoproksil</u>	(01) Barkod: (21) Sıra numarası:
30 Film Tablet		KAREKOD
Firma Logo	ÜRÜN ADI 245 mg Film Tablet <u>Tenofovir disoproksil</u>	
30 Film Tablet		
Ruhsat Sahibi: Üretim Yeri: Ruhsat No: Formül: Ağızdan alınır. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Kesilmiş veya açılmış ambalajları satın almayınız. Kullanmadan önce kullanma talimatını okuyunuz. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza başvurunuz. Reçeteli satılır.	BARKOD 21 PAP	

Grafik Çalışması - Örnek Tasarım

Braille (körler Alfabeti)

Ürün Adı 245 mg Film Kaplı Tablet

Renk

CYAN	YELLOW
MAGENTA	BLACK

Pilaj

Lakuz Alan

Bışak

Firma Logo

Ürün Adı
245 mg Film Kaplı Tablet
Tenofovir disoproksil fumarat

30 Film Kaplı Tablet

Firma Logo


Ürün Adı
245 mg Film Kaplı Tablet
Tenofovir disoproksil fumarat

30 Film Kaplı Tablet

Ruhsat Sahibi:
Üretim Yeri:
Ruhsat No:
Formül:
Ağızdan alınır.
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Kesilmiş veya açılmış ambalajları satın almayınız.
Kullanmadan önce kullanma talimatını okuyunuz.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza başvurunuz.
Reçeteli satılır.

BARKOD

Firma Logo	ÜRÜN ADI 245 mg Film Tablet <u>Tenofovir Disoproksil</u>	Firma Logo	ÜRÜN ADI 245 mg Film Tablet <u>Tenofovir Disoproksil</u>	Son. Kul. Ta.:
Firma Logo	ÜRÜN ADI 245 mg Film Tablet <u>Tenofovir Disoproksil</u>	Firma Logo	ÜRÜN ADI 245 mg Film Tablet <u>Tenofovir Disoproksil</u>	
Firma Logo	ÜRÜN ADI 245 mg Film Tablet <u>Tenofovir Disoproksil</u>	Firma Logo	ÜRÜN ADI 245 mg Film Tablet <u>Tenofovir Disoproksil</u>	
Firma Logo	ÜRÜN ADI 245 mg Film Tablet <u>Tenofovir Disoproksil</u>	Firma Logo	ÜRÜN ADI 245 mg Film Tablet <u>Tenofovir Disoproksil</u>	
Firma Logo	ÜRÜN ADI 245 mg Film Tablet <u>Tenofovir Disoproksil</u>	Firma Logo	ÜRÜN ADI 245 mg Film Tablet <u>Tenofovir Disoproksil</u>	



ŞURUP ÖRNEK ÇALIŞMASI

Gelen Taslak

KAREKOD	
ÜRÜN ADI Şurup Formül: Ağızdan alınır. Kullanmadan önce kullanma talimatını okuyunuz. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza başvurunuz. 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak saklayınız. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Kesilmiş veya açılmış ambalajları satın almayınız. Reçeteli satılır. 	ÜRÜN ADI Şurup Butamirat Sitrata 22.5mg/5ml 100 ml Firma Logo
Ruhsat Sahibi: Üretim yeri: Ruhsat No:	ÜRÜN ADI Şurup Butamirat Sitrata 22.5mg/5ml 100 ml Firma Logo
BARKOD	
ÜRÜN ADI Şurup Parti No : Son Kul. Ta. :	

Grafik Çalışması - Örnek Tasarım

Braille (körler Alfabesi) ÜRÜN ADI FORT 22.5mg/5ml Şurup 	
	
	
	

Gelen Taslak

Ürün Adı
Şurup

Butamirat Sitrat
22.5mg/5ml

100 ml

Firma Logo

Formül:

Kullanmadan önce kullanma talimatını okuyunuz.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza başvurunuz.
25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak saklayınız.
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Kesilmiş veya açılmış ambalajları satın almayınız.
Reçeteli satılır.

Ruhsat Sahibi :

Üretim Yeri:

Ruhsat No:

Grafik Çalışması - Örnek Tasarım

Renk

K

SİYAH

P

199 C

P

552 C

-

Laksız Alan

Pilyaj

Bıçak

Firma Logo

Ürün Adı® FORT
22.5mg/5ml Şurup
Butamirat Sitrat

100ml

Ağızdan alınır.
25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve orijinal ambalajında saklayınız.

Ruhsat Sahibi:
Üretim Yeri: : :
Ruhsat No:
Formül:
Dizayn No:

Parti No:
Son Kul. Ta:

FARMAKOD

İNGİLİZCE ÖRNEK ÇALIŞMA

İngilizce

Gelen Taslak


Product Name %0.25 Ointment <u>Thiocolchicoside</u> 30 g	Product Name %0.25 Ointment Thiocolchicoside 30 g
Product Name %0.25 Ointment Thiocolchicoside 30 g	Product Name %0.25 Ointment Thiocolchicoside 30 g
Product Name %0.25 Ointment Thiocolchicoside 30 g	Product Name %0.25 Ointment Thiocolchicoside 30 g

Grafik Çalışması - Örnek Tasarım


Product Name %0.25 Ointment Thiocolchicoside 30 g	Product Name %0.25 Ointment Thiocolchicoside 30 g
Product Name %0.25 Ointment Thiocolchicoside 30 g	Product Name %0.25 Ointment Thiocolchicoside 30 g
Product Name %0.25 Ointment Thiocolchicoside 30 g	Product Name %0.25 Ointment Thiocolchicoside 30 g

İngilizce

Gelen Taslak



Grafik Çalışması - Örnek Tasarım



İngilizce Gelen Taslak

Grafik Çalışması - Örnek Tasarım

PACKAGE LEAFLET: INFORMATION FOR THE PATIENT

PRODUCT NAME (Ointment 0.25 %)
For external use.

Active ingredient:
In 30 g tubes
Thioclochicoside 75 mg

Excipient(s):

Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine because it contains important information for you.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- If you have any further questions, ask your doctor/pharmacist.
- This medicine has been prescribed for you only. Do not pass it on to others.
- During the use of this drug, tell that you are using this medication when you go to the doctor or hospital.
- Follow exactly what is written in this leaflet. Do not use lower or higher dose except recommended dose for you.

What is in this leaflet:
1. What **PRODUCT NAME** is and what it is used for?
2. What you need to know before you use **PRODUCT NAME**?
3. How to use **PRODUCT NAME**?
4. Possible side effects
5. How to store **PRODUCT NAME**?

1. What **PRODUCT NAME** is and what it is used for?

PRODUCT NAME contains thioclochicoside active ingredient. 30 g aluminum tube contains 75 mg of active ingredient.

PRODUCT NAME has muscle relaxant activity. Thioclochicoside used for the symptomatic treatment of painful muscle spasms.

2. What you need to know before you use **PRODUCT NAME**?

Don't use **PRODUCT NAME in the following situations:**

- The situation can not contract the muscles or muscle
- You have hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients
- You are in pregnancy or breast feeding period.

1

In addition, the use of **PRODUCT NAME** children under the age of 15 is not recommended.

Use **PRODUCT NAME cautiously in the following situations:**

If you use long term (hypersensitivity may occur).

Tell your doctor at once if any of these apply to you even in any period at past.

Taking **PRODUCT NAME with food and drink:**
PRODUCT NAME is no interaction with food and drinks.

Pregnancy
Ask your doctor or pharmacist for advice before taking this medicine.

Do not use **PRODUCT NAME** if you are pregnant.

If you notice that you are pregnant during treatment, ask your doctor or pharmacist.

Breast-feeding
Ask your doctor or pharmacist for advice before taking this medicine.

If you are breastfeeding, do not use **PRODUCT NAME**.

Driving and using machines
Rarely, somnolence have been reported. Therefore, please be careful when using tools and machines.

Important information about some excipients of **PRODUCT NAME**
This medicinal product contains methyl parahydroxybenzoate and propyl parahydroxybenzoate. These substances can cause urticaria and allergic reactions such as contact dermatitis accompanied by bronchospasm (possibly delayed).
Contains cetostearyl alcohol. Therefore, the local skin reactions (eg contact dermatitis) may result.
Contains propylene glycol. Thus the skin can cause irritation.

Use with other medicines
Any interaction has not been reported.
If any prescription or non-prescription medications you are currently using or have used recently, please give them information about your doctor or pharmacist.

3. How to use **PRODUCT NAME**?

Instructions for right use and dose/ frequency of administration:
Unless advised otherwise by your doctor apply a day 2-3 times.

Way and method of administration:
Apply rubbing the painful area on the skin surface.

2

• Allergic skin reactions, skin rashes
These are all serious side effects. You may need urgent medical attention.

If you notice any of the following please tell your doctor:

- Nausea,
- Vomiting,
- Diarrhea,
- Stomach pain.

These are the **PRODUCT NAME** mild side effects.

If you experience any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

Reporting side effects
In case of any side effect stated or not stated in the Patient Information Leaflet, consult your doctor, pharmacist or nurse. Also, please report the side effects you have to Turkish Pharmacovigilance Center (TUFAM) by either clicking to "Reporting Drug Side Effect" icon on www.ticak.gov.tr or calling side effect reporting line via 0 800 314 00 08. By reporting the side effects occurring, you will contribute us to have more information about the safety of the drug that you use.

5. How to store **PRODUCT NAME**?

Keep this medicine out of the sight and reach of children and store in the original package.

Store at room temperature below 25 ° C.

Use in accordance with the expiry date.

Do not use **PRODUCT NAME** after the expiry date on the package.

Do not use **PRODUCT NAME** if you notice any change in medicine or package.

Marketing Authorisation Holder:

Manufacturer:

This leaflet was approved on

4

Different age groups:
Use in children:
Do not use this medicine in children under the age of 15.

Use in the elderly:
Safety and efficacy have not been studied in elderly patients **PRODUCT NAME**.

Special use cases:
Safety and efficacy of **PRODUCT NAME** have not been investigated with kidney/liver failure in patients.

Use in renal/hepatic impairment:
Liver/kidney impairment.
Safety and efficacy of **PRODUCT NAME** has not been studied in patients with liver/kidney failure.

If you have an impression about effect of **PRODUCT NAME** that it is too strong or, too weak, tell your doctor or pharmacist.

If you use more **PRODUCT NAME** than you should.

If you use more **PRODUCT NAME** than you were told to, tell your doctor or pharmacist.

If you forget to use **PRODUCT NAME**

Do not use a double dose to make up for a forgotten dose.

If you stop taking **PRODUCT NAME**
It does not cause any effect.

4. Possible side effects
Like all medicines, this medicine can cause side effects to persons who have hypersensitivity to any of the ingredients of **PRODUCT NAME**.

If any of the following, please stop using the **PRODUCT NAME** and notify your doctor immediately or contact your nearest hospital emergency department.

- Pruritus, rash, hypersensitivity reactions such as sudden allergies result in swelling of the face and throat

These are all very serious side effects.
If one of them is present in you, then you have a serious allergy in your **PRODUCT NAME**.
You may need urgent medical attention or hospitalization.

If you notice any of the following please notify your doctor immediately or contact your nearest hospital emergency department.

- Dizziness, somnolence

3

Color

K Black

Dimension

PATIENT INFORMATION LEAFLET

Product Name Ointment 0.25 %
For external use.

Active ingredient:
In 30 g tubes
Thioclochicoside 75 mg

Excipient(s):

Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine because it contains important information for you.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- If you have any further questions, ask your doctor/pharmacist.
- The medicine has been prescribed for you only. Do not pass it on to others.
- During the use of this drug, tell that you are using this medication when you go to the doctor or hospital.
- Follow exactly what is written in this leaflet. Do not use lower or higher dose except recommended dose for you.

What is in this leaflet:
1. What **Product Name** is and what it is used for?
2. What you need to know before you use **Product Name**?
3. How to use **Product Name**?
4. Possible side effects
5. How to store **Product Name**?

1. What **Product Name** is and what it is used for?

Product Name contains thioclochicoside active ingredient. 30 g aluminum tube contains 75 mg of active ingredient.

Product Name has mainly muscle relaxant activity. Thioclochicoside used for the symptomatic treatment of painful muscle spasms.

2. What you need to know before you use **Product Name**?

Don't use **Product Name in the following situations:**

- The situation can not contract the muscles or muscle
- You have hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients
- You are in pregnancy or breast feeding period

In addition, the use of **Product Name** children under the age of 15 is not recommended.

Use **Product Name cautiously in the following situations:**

If you use long term (hypersensitivity may occur)

1

Tell your doctor at once if any of these apply to you even in any period at past.

Taking **Product Name with food and drink:**
Product Name is no interaction with food and drinks.

Pregnancy
Ask your doctor or pharmacist for advice before taking this medicine.

Do not use **Product Name** if you are pregnant

If you notice that you are pregnant during treatment, ask your doctor or pharmacist

Breast feeding
Ask your doctor or pharmacist for advice before taking this medicine

If you are breastfeeding, do not use **Product Name**.

Driving and using machines
Rarely, somnolence have been reported. Therefore, please be careful when using tools and machines.

Important information about some excipients of **Product Name**
This medicinal product contains methyl parahydroxybenzoate and propyl parahydroxybenzoate. These substances can cause urticaria and allergic reactions such as contact dermatitis accompanied by bronchospasm (possibly delayed).
Contains cetostearyl alcohol. Therefore, the local skin reactions (eg contact dermatitis) may result.
Contains propylene glycol. Thus the skin can cause irritation.

Use with other medicines
Any interaction has not been reported.
If any prescription or non-prescription medications you are currently using or have used recently, please give them information about your doctor or pharmacist.

3. How to use **Product Name**?

Instructions for right use and dose/ frequency of administration:
Unless advised otherwise by your doctor apply a day 2-3 times.

Way and method of administration:
Apply rubbing the painful area on the skin surface.

2

Different age groups:
Use in children:
Do not use this medicine in children under the age of 15.

Use in the elderly:
Safety and efficacy have not been studied in elderly patients **Product Name**.

Special use cases:
Safety and efficacy of **Product Name** have not been investigated with kidney/liver failure in patients.

Use in renal/hepatic impairment:
Liver/kidney impairment.
Safety and efficacy of **Product Name** has not been studied in patients with liver/kidney failure.

If you have an impression about effect of **Product Name** that it is too strong or, too weak, tell your doctor or pharmacist.

If you use more **Product Name** than you should.

If you use more **Product Name** than you were told to, tell your doctor or pharmacist.

If you forget to use **Product Name**

Do not use a double dose to make up for a forgotten dose.

If you stop taking **Product Name**
It does not cause any effect.

4. Possible side effects
Like all medicines, this medicine can cause side effects to persons who have hypersensitivity to any of the ingredients of **Product Name**.

If any of the following, please stop using the **Product Name** and notify your doctor immediately or contact your nearest hospital emergency department.

- Pruritus, rash, hypersensitivity reactions such as sudden allergies result in swelling of the face and throat

These are all very serious side effects.
If one of them is present in you, then you have a serious allergy to your **Product Name**.
You may need urgent medical attention or hospitalization.

If you notice any of the following please notify your doctor immediately or contact your nearest hospital emergency department.

- Dizziness, somnolence
- Allergic skin reactions, skin rashes

These are all serious side effects. You may need urgent medical attention.

If you notice any of the following please tell your doctor:

- Nausea,
- Vomiting,
- Diarrhea,
- Stomach pain

These are the **Product Name** mild side effects.

3

If you experience any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

Reporting side effects
In case of any side effect stated or not stated in the Patient Information Leaflet, consult your doctor, pharmacist or nurse. Also, please report the side effects you have to Turkish Pharmacovigilance Center (TUFAM) by either clicking to "Reporting Drug Side Effect" icon on www.ticak.gov.tr or calling side effect reporting line via 0 800 314 00 08. By reporting the side effects occurring, you will contribute us to have more information about the safety of the drug that you use.

6. How to store **Product Name**?

Keep this medicine out of the sight and reach of children and store in the original package.

Store at room temperature below 25 ° C.

Use in accordance with the expiry date.

Do not use **Product Name** after the expiry date on the package.

Do not use **Product Name** if you notice any change in medicine or package.

Marketing Authorisation Holder:

Manufacturer:

This leaflet was approved on

4

**ARAPÇA
ÖRNEK ÇALIŞMA**

İngilizce - Arapça

Gelen Taslak

اسم المنتج كريم 1% وكسيكونازول نيترات 10 جم		Batch No.: Mfg. Date.: Exp. Date.:
Company Logo		
Marketing Holder: Manufacturer: Formula:	For external use. Keep out of reach and sight of children and in its original container. Keep at room temperature below 30°C. Do not purchase deformed packages. Read the package leaflet before use. When you experience unexpected effects, contact your doctor. For prescription only.	
Product Name 1% Cream	Product Name 1% Cream Oxiconazole Nitrate 10 g Company Logo	
المالك المفوض بالتسويق: الشركة المصنعة: التركيبة: للاستخدام الخارجي. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال ومشاعتهن وفي عبوته الأصلية. يحفظ في درجة حرارة أقل من 30 درجة مئوية. لا تشتري العبوة المشدنة أو المتورقة. اقرأ نشرة معلومات المريض قبل الاستخدام. عندما تواجه تأثيرات غير متوقعة ، اتصل بطبيبك. يستخدم بوصفة طبية فقط.		
Barcode		

Grafik Çalışması - Örnek Tasarım

Color K Siyah P 1595 C P Reflex Blue C P Process Blue C Varnishfree Area Dimension	
Marketing Authorisation Holder: Manufacturer: Formula: Barcode	
For external use. Keep out of reach and sight of children and in its original package. Do not store above 30°C. Do not buy torn or opened packages. Read the patient information leaflet before use. When you experience unexpected effects, contact with your doctor. For prescription only.	
Company Logo اسم المنتج كريم 1% أوكسيكونازول نيترات 10 جم	
المالك المفوض بالتسويق: الشركة المصنعة: التركيبة: للاستخدام الخارجي. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال ومشاعتهن وفي عبوته الأصلية. يحفظ في درجة حرارة أقل من 30 درجة مئوية. لا تشتري العبوة المشدنة أو المتورقة. اقرأ نشرة معلومات المريض قبل الاستخدام. عندما تواجه تأثيرات غير متوقعة ، اتصل بطبيبك. يستخدم بوصفة طبية فقط.	
Product Name 1% Cream Product Name 1% Cream Oxiconazole Nitrate 10 g Company Logo	

Arapça

Gelen Taslak



Grafik Çalışması - Örnek Tasarım



*Teşekkür
Ederiz*



212 283 74 10



www.intime.com.tr

intime

Reklamcılık Hizmetleri A.Ş.